



女性がん患者の 直面すること



NPO法人女性特有のがんのサポートグループ オレンジティ
理事長 河村裕美




自己紹介

- 1999年 7月 4日 入籍
- 1999年 7月11日 子宮頸がん告知
- 1999年 8月 4日 手術
- 1999年 9月 4日 退院
- 1999年11月 1日 仕事復帰
- 2002年 1月26日 オレンジティ設立
- 2009年 4月 1日 社団法人ティール & ホワイトプロジェクト設立

現在、静岡県庁空港利用政策課勤務の傍ら、オレンジティなどの活動を行っている

子宮頸がん



子宮頸がんのステージ

0期	0期の子宮頸がんは非常に早期のがん。がんは子宮頸部の上皮内のみに認められる。	
I期	がんが子宮頸部に限局して認められ、他へ拡がっていない状態(ただし子宮体部浸潤の有無は考慮しない)	
	Ia期	組織学的にのみ診断できる浸潤がんで、肉眼的に明らかな病巣はたとえ表層浸潤であってもIb期とする。
	Ib期	臨床的に明らかな病巣が子宮頸部に限局するもの、または臨床的に明らかではないがIa期を越えるもの
II期	がんが子宮頸部を越えて拡がるが、骨盤壁または、膣壁の下1/3には達していないもの	
III期	がんが骨盤壁まで達するもので、がんと骨盤壁との間にがんでない部分を持たないもの または膣壁浸潤が下方部分1/3を越えるもの	
IV期	がんが小骨盤腔を越えて拡がるか、膀胱・直腸の粘膜にも拡がっているもの	

子宮頸がんの治療

■外科療法

(1)早期がんに対する治療(治療は以下のうちのいずれか)

- 凍結療法:がん細胞を凍らせて殺します。
- 高周波療法:高周波を用いて電磁波の熱でがん細胞を殺す。
- レーザー治療:レーザー光線を用いてがんを殺す。

(2)手術治療(外科手術は最も一般的で、医師は以下の術式のひとつを用いてがんを取り除く。)

- **円錐切除術**
がんが見つかった子宮の頸部組織を円錐状の組織として切除します。円錐切除は生検組織をとる診断的意味の他に、早期がんでは治療的意味も含む。
- **単純子宮全摘出術**
がんに侵された子宮を摘出する手術。子宮が経腔的に摘出されれば腔式単純子宮全摘、腹壁を切開して行われれば腹式単純子宮全摘という。ときには、両側付属器切除術といい、卵巣・卵管も切除される。
- **広汎子宮全摘出術**
患部を子宮と腔の一部を含め、骨盤壁近くから広い範囲で切除。子宮頸がんに関連する所属リンパ節も同時に切除(リンパ節郭清)。
- **骨盤内臓全摘術**
がんが子宮頸部ばかりでなく女性性器外に広がっていると、子宮・腔とともに下部結腸、直腸、膀胱を切除する。

■放射線療法

■化学療法

ご存知ですか？ 子宮頸がんの後遺症

- 子供が産めなくなる
- 排尿・排便障害
- 卵巣欠落症候群（更年期障害）
- リンパ浮腫



リンパ浮腫



写真提供:小澤治療院



<http://o-tea.org>

ご存知ですか？ 子宮頸がんの後遺症

- 子供が産めなくなる
- 排尿・排便障害
- 卵巣欠落症候群（更年期障害）
- リンパ浮腫
- 性交渉の問題




女性ががん患者が直面する問題

- 医療者との関係
- 問題を一人で抱え込む
- 家族とのコミュニケーションのずれ
- 後遺症との付き合い方
- 仕事、社会とのかかわり



オレンジティとは？

ミッション: オレンジティは、あなたの描くライフデザインを応援します。



詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。

オレンジティで検索！

あなたにできること・できないこと

1

情報の引き出しを
たくさん持つこと

2

検診のすすめ

3

啓発活動への参加



みなさんをお願いしたいこと

関心を持ってください。
正しい情報を持ってください。
お母さんになれなかった、1人の女性からのお願いです。

